

Saltarillas – Los arces rojos y Freeman sufrieron los mayores daños en viveros de los Condados de Ozaukee, Pierce, St. Croix, Walworth y Washburn.

Jején de agallas de abetos, (*Mayetiola piceae*) – Se observaron números moderados de agallas en abetos blancos en un vivero del Condado de Sawyer y en abetos de Colorado en un vivero del Condado de Taylor.

Gusano de telarañas otoñales – Se agrandaban las telarañas en diversos árboles de sombra en viveros de los Condados de Ozaukee, Polk y Sheboygan.

Adélgido de agallas de abetos orientales – Se observaron números moderados de agallas en abetos blancos en viveros de los Condados de Polk, Sawyer y St. Croix.

Gorgojo de collarín de raíz – Números moderados de pinos escoceses murieron como consecuencia de este insecto en un vivero del Condado de Pierce.

Polilla de pinos Zimmerman – Se encontró una infestación severa en pinos escoceses en un vivero del Condado de Pierce.

Barrenillo de abedul bronceado – Abedules de papel y abedules de copa blanca fueron atacados por este barrenillo de cabeza plana en viveros de los Condados de Ozaukee y Sheboygan.

Gusano de bolsa – Una infestación de este insecto más sureño se encontró en árboles de la vida en un vivero del Condado de Ozaukee.

Gorgojo de pino blanco – Se encontraron larvas que se alimentaban en cantidades grandes, causando la pérdida de puntas brotadas terminales de pinos blancos, así como abetos noruegos y blancos, en un vivero del Condado de Sawyer.

Jején de agallas de agujas balsámicas – Se observaron en abetos balsámicos en cantidades moderadas en un vivero del Condado de Sawyer.

Devorador de hojas de abeto – Se observó pérdida de agujas debido a cantidades ligeras de devoradores de hojas de abeto en abetos negros en un vivero del Condado de St. Croix.

Moho de agujas de abeto – Fueron observables pústulas anaranjadas en las caras inferiores de las agujas en cantidades moderadas en abetos de Colorado y en abetos blancos en viveros de los Condados de Sawyer y St. Croix.

Manchas de hojas por septoria – Cornejos de ramas rojas, grises y tipo pagoda en viveros de los Condados de Ozaukee, Polk, Sheboygan, Taylor, Walworth y Waukesha presentaron cantidades moderadas a grandes de manchas en las hojas debidas a este hongo.

Roya de los pinos blancos – Pinos blancos en viveros de los Condados de Polk y Sawyer presentaron cantidades moderadas de **roya** que causa mortalidad.

Manchas de alquitrán – Arces plateados y Freeman presentaron números moderados de manchas en las hojas causadas por este hongo en varios viveros de los Condados de Ozaukee y Waupaca.

Manchas de hojas por moho azul – Manzanos silvestres tipo Robinson presentaron cantidades moderadas de esta enfermedad en un vivero del Condado de Sheboygan.

Arador eriófidio en flor conífera púrpura – Un particular encontró un arador eriófidio en flores coníferas púrpura en el Condado de Dane. El arador ataca la cabeza de la semilla causando una distorsión similar a los **amarillos en reinas Margarita**.